



Physik IV: Integrierter Kurs (Theoretische Physik)
Sommersemester 2019 - Übungsblatt 10
Ausgabe: 19.6., Abgabe: 26.6., Übungen: 28.6.

Aufgabe 27: Vektoren und Darstellungen

(8 Punkte)

Durch $\{|a_1\rangle, |a_2\rangle\}$ sei in einem zweidimensionalen Raum eine orthonormierte Basis gegeben (Basis der $\{a\}$ Darstellung). Zwei Zustandsvektoren $|b_1\rangle, |b_2\rangle$ seien durch

$$|b_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|a_1\rangle + i|a_2\rangle), \quad |b_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|a_1\rangle - i|a_2\rangle)$$

gegeben.

- Zeigen Sie, dass die Vektoren $|b_1\rangle, |b_2\rangle$ ebenfalls eine orthonormierte Basis bilden. (2 Punkte)
- Geben Sie die $\{a\}$ -Darstellung der Ketvektoren $|a_1\rangle, |a_2\rangle, |b_1\rangle, |b_2\rangle$ an. (2 Punkte)
- Geben Sie die Transformationmatrix U von der $\{a\}$ - in die $\{b\}$ -Darstellung an und verifizieren Sie, dass U unitär ist. (2 Punkte)
- Geben Sie die $\{b\}$ -Darstellung der Ketvektoren $|a_1\rangle, |a_2\rangle$ an. (2 Punkte)

Aufgabe 28: Allgemeine Formulierung der Schrödinger-Robertson Unschärferelation

(mündlich)

Die quantenmechanische Unschärferelation hängt mit der mathematischen Tatsache zusammen, dass nicht-kommutierende hermitesche Matrizen (also nicht-kommutierende Observablen) keine gemeinsame Eigenbasis haben. Dies soll in dieser Aufgabe an einem Beispiel demonstriert und diskutiert werden. Gegeben sei der Zustandsvektor $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, wobei $|0\rangle, |1\rangle$ ein vollständiges Orthonormalsystem bilden und in einer Basis \mathcal{B} als Einheitsvektoren

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

dargestellt werden. α und β sind zwei komplexe Zahlen, wobei die Normierungsbedingung erfordert, dass $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

- Berechnen Sie die Eigenvektoren $|a_{1,2}\rangle$ und die Eigenwerte $a_{1,2}$ des Operators \hat{A} gegeben durch $\hat{A}|0\rangle = |1\rangle$ und $\hat{A}|1\rangle = |0\rangle$.
Bestimmen Sie den Erwartungswert $\langle \hat{A} \rangle$ des Operators \hat{A} im Zustand ψ .

- b) Berechnen Sie die Eigenvektoren $|b_{1,2}\rangle$ und die Eigenwerte $b_{1,2}$ des Operators \hat{B} gegeben durch $\hat{B}|0\rangle = |0\rangle$ und $\hat{B}|1\rangle = -|1\rangle$.
Berechnen Sie den Erwartungswert $\langle\hat{B}\rangle$ des Operators \hat{B} im Zustand ψ .
- c) Drücken Sie die allgemeine Unschärferelation für Operatoren \hat{A} und \hat{B} im Zustand ψ ,

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle|,$$

durch α und β aus. Hierbei sind $(\Delta A)^2 = \langle\hat{A}^2\rangle - \langle\hat{A}\rangle^2$ und $(\Delta B)^2 = \langle\hat{B}^2\rangle - \langle\hat{B}\rangle^2$ die Standardabweichungen. Wie lautet diese Unschärferelation, wenn α und β reelle Zahlen sind? Für welche Zustände ist die Unschärfe minimal?

- d) Zeigen Sie schließlich, dass diese Unschärferelation für gegebene Operatoren \hat{A} und \hat{B} und den Zustand ψ tatsächlich für allgemeine α und β erfüllt ist.
Hinweis: Verwenden Sie die Eulerformel für komplexe Zahlen $\alpha = |\alpha|e^{i\phi_\alpha}$ und $\beta = |\beta|e^{i\phi_\beta}$.

Aufgabe 29: Summenregeln

(mündlich)

Ein Hamiltonoperator der Form $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{r})$ besitze ein rein diskretes Energiespektrum: $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$.

- a) Zeigen Sie, dass für die Matrixelemente der \hat{x}_k -Komponente des Ortsoperators in der Energiedarstellung die sogenannte *Thomas-Reiche-Kuhn-Summenregel*

$$\sum_{n'} (E_{n'} - E_n) |\langle n' | \hat{x}_k | n \rangle|^2 = \frac{\hbar^2}{2m}$$

gilt. Werten Sie dazu den Doppelkommutator $[\hat{x}_k, [\hat{H}, \hat{x}_k]]$, $k = 1, 2, 3$ aus. Bilden Sie geeignete Matrixelemente mit den Eigenzuständen von \hat{H} auf beiden Seiten der so entstehenden Gleichung und verwenden Sie die Vollständigkeitsrelation $\sum_n |n\rangle\langle n| = 1$.

- b) Beweisen Sie, indem Sie durch Auswerten des Kommutators $[\hat{H}, \hat{x}_k]$ die Matrixelemente $\langle n' | \hat{p}_k | n \rangle$ durch die $\langle n' | \hat{x}_k | n \rangle$ ausdrücken, die in den Energiedifferenzen quadratische Summenregel

$$\sum_{n'} (E_{n'} - E_n)^2 |\langle n' | \hat{x}_k | n \rangle|^2 = \frac{\hbar^2}{m^2} \langle n | \hat{p}_k^2 | n \rangle.$$

Bemerkung: Diese Summenregeln finden bei der Untersuchung von optischen Übergängen in Atomen und Molekülen Anwendung.